

---

# TORENIA

Pěstitelské pokyny  
právně chráněné odrůdy



**EUROPLANT**  
šlechtitelská spol. s r. o.  
Lhotská 2221/32  
193 00 Praha 9  
Horní Počernice

Tel.: 281 923 901  
281 923 902  
Fax: 281 923 900  
281 923 903

E-mail: [info@europlant.cz](mailto:info@europlant.cz)  
[www.europlant.cz](http://www.europlant.cz)

---

Odrůda Torenia je právně chráněna.

# TORENIA

**Poloraná salátová i přílohová odrůda výborné vnitřní i vnější kvality a chutě, pevné konzistence, též vhodná pro loupání, varný typ A.**

- Torenia dosahuje, díky třídění vhodnému pro balení a vzhledově líbivými oválnými až dlouze-oválnými hlízkami se síťovanou slupkou, plochými očky a žlutou dužninou výborných odbytových výsledků.
- Její vnitřní kvality, společně s jejími výbornými agronomickými vlastnostmi, podporují možnosti umístění této odrůdy na trhu.

## **Pěstitelské pokyny:**

**TORENIA** upřednostňuje střední polohy s jistějším zavlažováním. Vysoký počet produkovaných hlízk je event. nutno podpořit i dalším zavlažováním.

## **Sázení a hnojení - zvláštní pokyny:**

**Torenia** může být sázena se sponem 30-32 cm (tj. ca 43.000 sazenic na hektar, 35/50). Hloubka vsazení standardní.

**Torenia** má vynikající klidové období, avšak těsně před sázením (3-4 dny) je vhodný tepelný šok. Doporučuje se moření proti Rhizoctonii.

**Torenia** je vděčná za harmonické hnojení. Dusíkaté hnojení – tato odrůda má velkou schopnost vstřebávat dusík – neměla by být proto překročena celková doporučená hodnota do 120 kg/ha (včetně Nmin, organického hnojení, +/- místních korektur). Na místech, kde hrozí vymývání živin vodou, lze aplikovat dávky přes 80 kg/N/ha. Vedle důrazu na hnojení K<sub>2</sub>O (200-250 kg/ha – do 150 kg/ha je možno použít i chlorid) a P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (vodou ředitelný fosfát přímo k rostlině – 100 kg/ha) by se mělo dbát na dostatečný přívod hořčíku (60 kg/ha), který zaručí dobrý výnos i kvalitu hlízk. Pro hnojení na list není žádné paušální doporučení, možno aplikovat doplňkově na krizových místech. Celkově je zdraví listů u Torenii velmi dobré a není třeba zvláštních opatření proti Alternarii.

<b>Doba zralosti</b>	poloraná	<b>Hlízka:</b> <b>tvár</b> <b>uložení oček</b> <b>barva dužniny</b> <b>slupka</b>	oválný už dlouze-oválný ploché žlutá síťovaná
<b>Konzumní hodnota</b>	pevná salátová odrůda se (sytě) žlutou barvou dužniny	<b>Odolnost</b> <b>hád'átku brambor.</b> <b>rakovině brambor.</b>	Ro 1(9), 4(9) D1
<b>Výnos</b>	vysoký výnos	<b>Odolnost</b> <b>strupovitosti</b> <b>rziivosti</b> <b>černání dužniny</b> <b>mechan. poškození</b>	velmi vysoká velmi vysoká velmi vysoká až vysoká vysoká až střední
<b>Počáteční vývoj</b>	pozvolný		
<b>Skladování</b>	výhodná doba klidu		

Údaje o odrůdách vycházejí z výsledků oficiálních pokusů na odrůdách anebo z vlastních zkušeností. Protože jsou ale brambory přírodním produktem, nemůžeme za tyto údaje převzít úplnou záruku.